

WICHTIG - PATIENTENPASS**Abacavir/Lamivudin Mylan Pharma 600 mg/300 mg Filmtabletten
(Abacavir/Lamivudin)****Tragen Sie diese Karte immer bei sich.**

Da Abacavir/Lamivudin Mylan Pharma Abacavir enthält, können einige Patienten, die dieses Arzneimittel einnehmen, möglicherweise eine Überempfindlichkeitsreaktion (schwerwiegende allergische Reaktion) entwickeln. **Diese kann lebensbedrohlich werden**, wenn dieses Arzneimittel weiterhin eingenommen wird.

SETZEN SIE SICH SOFORT MIT IHREM ARZT IN VERBINDUNG, damit er entscheiden kann, ob Sie die Therapie mit diesem Arzneimittel absetzen müssen, wenn:

- 1) Sie einen Hautausschlag bekommen ODER**
- 2) Sie aus mindestens ZWEI der folgenden Gruppen eines oder mehrere Symptome (Beschwerden) entwickeln:**
 - Fieber
 - Kurzatmigkeit, Halsschmerzen oder Husten
 - Übelkeit oder Erbrechen oder Durchfall oder Bauchschmerzen
 - starke Müdigkeit oder diffuse Schmerzen oder ein allgemeines Unwohlsein

Wenn Sie Abacavir/Lamivudin Mylan Pharma aufgrund einer solchen Überempfindlichkeitsreaktion abgesetzt haben, **NEHMEN SIE NIE WIEDER Abacavir/Lamivudin Mylan Pharma** oder ein anderes Abacavir-haltiges Arzneimittel (z. B. Abacavir/Lamivudin, Abacavir/Lamivudin/Zidovudin, Abacavir/Dolutegravir/Lamivudin) ein, da es **innerhalb von Stunden** zu einem lebensbedrohlichen Blutdruckabfall oder zum Tod kommen kann.

(siehe Rückseite der Karte)

Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich bei Ihnen eine Überempfindlichkeitsreaktion auf Abacavir/Lamivudin Mylan Pharma entwickelt, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Arzt in Verbindung. Notieren Sie sich hier den Namen und die Anschrift Ihres behandelnden Arztes:

Arzt:

Tel:

Wenn Ihr Arzt nicht erreichbar ist, müssen Sie sofort nach einer anderen Möglichkeit suchen, ärztlichen Rat einzuholen (z. B. die Notfallambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses).

Für allgemeine Anfragen zu Abacavir/Lamivudin Mylan Pharma wenden Sie sich bitte an Mylan Germany GmbH, Tel.: (0800) 0700 800.